3.4

CONJUNTIVITIS

SIGNOS Y SÍNTOMAS

- Una adecuada anamnesis es necesaria en los cuadros oftalmológicos.
- Inicialmente se debe realizar una evaluación de ojo rojo en un paciente.

EVALUACIÓN DE OJO ROJO

1. Agudeza visual.
2. Eversión tarsal: evertir el párpado para su examinación, determine presencia de cuerpo extraño, folículos o papilas.
3. Tamaño y forma de pupilas: tamaño y reacción fotomotora.
4. Estimación de la presión ocular: dígito presión o si está disponible la tonometría.
5. Determinar el tipo de ojo rojo:
 - a. Conjuntival
 - b. Palpebral o periférico.
 - c. Periquerático o ciliar.
 - d. Localizado.
6. Tipo de secreción: lagrimeo, secreción mucosa o purulenta.
7. Presencia de dolor o picazón.
8. Exploración de la cámara anterior y de la córnea: determinar tamaño de la cámara anterior y opacidades corneales.
9. Reacción con fluoresceína.
10. Fondo de ojo.

ETIOLOGÍA

- Viral: 85% de los casos de conjuntivitis, Adenovirus principalmente.
- Bacteriana: 10 -15% de los casos. Estafilococo aureus, Streptococo pneumoniae, Haemophilus influenzae, Moraxela catarrhalis.
- Alérgica: Producida por la degranulación de mastocitos y liberación de histamina.

SÍNTOMAS

- Viral: Ojo rojo, bilateral, secreción mucosa

o lagrimeo, adenopatía preauricular y conjuntivitis tarsal. Aparece frecuentemente posterior a infecciones respiratorias altas. Altamente contagiosa. Autolimitada en 1 a 2 semanas.

- Bacteriana: Ojo rojo, unilateral inicialmente, secreción muco-purulenta. Los párpados pueden adherirse uno a otro luego del sueño. Contagiosa y autolimitada.

- Alérgica: Ojo rojo, bilateral, con mucho prurito, secreción hialina o lagrimeo y presencia de conjuntivitis tarsal. Puede existir historia de alergias y atopias.

DIAGNÓSTICO

- El diagnóstico es clínico.
- El GRAM de secreción (*N. gonorrhoeae*), cultivo o antibiograma, son ocasionalmente útiles.

Abrasión Corneal

Hemorragia Conjuntival

Blefaritis

Conjuntivitis Bacteriana

Conjuntivitis Alérgica

Uveitis

DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL

- Abrasión corneal
- Hemorragia subconjuntival
- Blefaritis
- Glaucoma
- Uveitis

SIGNOS DE ALARMA

- Disminución de agudeza visual.
- Ojo rojo ciliar.
- Opacidad corneal.
- Hifema o hipopion.
- Reacción fotomotora pupilar alterada.
- Fotofobia
- Cefalea severa con náuseas

TRATAMIENTO

- Viral: Medidas de soporte. Compresas frías. Lágrimas artificiales.
- Lavado de manos frecuente.
- Bacteriana: Medidas de soporte. Compresas frías. Lágrimas artificiales. Lavado de manos frecuente. Colirio antibiótico de amplio espectro, Tobramicina o Gentamicina 0,3%, 2 gotas cada hora por 24 a 72 horas y luego TID por 5 días; Ciprofloxacina u Ofloxacina 0,3-0,5%, 2 gotas cada 2 horas por 24 a 72 horas y luego 4 veces/día por 5 días. Utilizar ungüento antibiótico oftálmico en la noche.
- Alérgica: Evitar los alérgenos desencadenantes. Lágrimas artificiales. Compresas frías. Vasoconstrictores, antihistamínicos, estabilizadores de mastocitos. Nafazolina 0.025% 2 gotas 4 veces/día, u Olopatadina 0.1% BID, o Cromolin Sódico 4% cuatro veces/día hasta el alivio de los síntomas.

PERLAS

- El uso de corticoides en las conjuntivitis está contraindicado ya que promueven la replicación viral, prolongan el período infec-

cioso, producen úlceras corneales y hasta perforación e incrementan la presión intraocular.

- Síntomas de emergencia: dolor ocular intenso, pérdida de la agudeza visual, fotofobia, proptosis y síntomas de más de una semana de evolución.

- La examinación de la cámara anterior y la presión intraocular ayudan al diagnóstico de glaucoma agudo de ángulo cerrado.

- El glaucoma agudo de ángulo cerrado es una emergencia médica y debe ser tratado urgentemente antes de la referencia al oftalmólogo.

- Bajo ninguna condición se deben prescribir anestésicos tópicos en casos de conjuntivitis, ya que poseen efectos tóxicos en el epitelio corneal.

- Los vasoconstrictores tópicos deben utilizarse con precaución, ya que pueden enmascarar otras patologías.

- Se prefieren los ungüentos antibióticos en lugar de colirios en niños.

BIBLIOGRAFÍA

1. Seth D, Khan FI. Causes and management of red eye in pediatric ophthalmology. *Curr Allergy Asthma Rep.* 2011 Jun;11(3):212-9
2. Jefferis J, Perera R, Everitt H, van Weert H, Rietveld R, Glasziou P, Rose P. Acute infective conjunctivitis in primary care: who needs antibiotics? An individual patient data meta-analysis. *Br J Gen Pract.* 2011 Sep;61(590):e542-8
3. Sethuraman U, Kamat D. The red eye: evaluation and management. *Clin Pediatr (Phila).* 2009 Jul;48(6):588-600
4. Cronau H, Kankanala RR, Mauger T. Diagnosis and management of red eye in primary care. *Am Fam Physician.* 2010 Jan 15;81(2):137-44.
5. Visscher KL, Hutnik CM, Thomas M. Evidence-based treatment of acute infective conjunctivitis: Breaking the cycle of antibiotic prescribing. *Can Fam Physician.* 2009 Nov;55(11):1071-5.
6. Wirbelauer C. Management of the red eye for the primary care physician. *AmJ Med.* 2006;119:302-306.
7. Greenberg MF, Pollard ZF. The red eye in childhood. *Pediatr Clin N Am.* 2003;50:105-124.